

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АЛТЕЙКА ГАЛИЧФАРМ
(ALTEYKA HALYCHPHARM)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 5 мл сиропу містять алтеї кореня екстракту сухого (*Althaeae radix*) (екстрагент вода) у перерахуванні на 20,0 % вміст полісахаридів – 7,5 мг;

допоміжні речовини: метилпарагідроксибензоат (Е 218), пропілпарагідроксибензоат (Е 216) (консерванти), етанол (96 %), цукор-рафінад, вода очищена.

Лікарська форма. Сироп.

Сиропоподібна рідина від жовто-бурого до червоно-бурого кольору зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається наявність осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ «Галичфарм».

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.

Код АТС R05C A05.

Сироп на основі екстракту кореня алтеї є комплексним рослинним препаратом, що містить полісахариди як основну діючу речовину, а також пектини, амінокислоти, крохмаль. Препарат чинить бронхосекреторну, відхаркувальну, обволікаючу дії. Рефлекторно стимулює секрецію бронхіальних та слинних залоз. Активує утворення мокротиння, нормалізуючи його реологічні властивості (в'язкість, еластичність, адгезивність), підсилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, спричиняючи цитопротекторний і протизапальний ефекти, сприяє регенерації тканин.

Показання для застосування.

Кашель при гострих та хронічних захворюваннях дихальних шляхів: бронхіти, ларингіти, трахеїти, бронхіальна астма, коклюш.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

У процесі зберігання допускається випадання осаду. Перед застосуванням збовтувати.

Якщо під час лікування розвивається задишка, підвищення температури або з'являється гнійне мокротиння, що не пов'язано з прийомом препарату, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Абсорбція препаратів, які застосовуються одночасно, може знижуватися. Інші препарати необхідно застосовувати за 1 годину до або через 1 годину після застосування екстракту кореня алтеї.

Особливі застереження.

З обережністю застосовувати при цукровому діабеті.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація про досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Застосування препарату не впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами, але слід враховувати, що у складі препарату міститься 96 % етанол.

Діти. Препарат можна застосовувати дітям віком від 2 років. Препарат містить 2 % спирту (в 1 мл сиропу – 0,02 мл спирту), тому дітям віком від 2 до 6 років перед застосуванням сироп слід розвести у кип'яченій воді.

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням збовтувати. Препарат призначати до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці сиропу 4-6 разів на добу.

Дітям віком від 6 до 14 років препарат призначати по 1 десертній ложці (10 мл) 4-6 разів на добу.

Дітям від 2 до 6 років необхідну кількість сиропу розводити у невеликій кількості кип'яченої води (10-15 мл або 2-3 чайні ложки):

віком від 2 до 6 років – по 5 мл сиропу 4-6 разів на добу.

Тривалість курсу терапії визначається індивідуально, залежно від ефективності лікування і, як правило, становить 7-14 днів.

Передозування.

Випадки передозування невідомі.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції, посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування і звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад, кодеїном).

Термін придатності.

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Після розкриття зберігати не більше 14 днів при температурі 4-8 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконі або банці; по 1 флакону або банці у пачці; по 200 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.