

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

МУКАЛІТАН

(MUCALITANUM)

Загальна характеристика.

основні фізико-хімічні властивості: таблетки сірувато-бурого кольору з краплинками;

склад: кожна таблетка містить: мукалтину 0,05 г; натрію гідро карбонату 0,087г;

допоміжні речовини: кислота винна, кальцію стеарат, тальк.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовують при кашлі та простудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТC R05C A 05.

Фармакологічні властивості. Відхаркувальний засіб з переважно секретолітичною дією. Лікувальні властивості препарату зумовлені дією комплексу рослинних речовин з алтею лікарського (полісахариди, пектини, амін окислоти та інш.), а також натрію гідро карбонату. Виявляючи слабкий подразнюючий вплив на рецептори слизової оболонки шлунка, рефлекторно стимулює секрецію бронхіальних та слинних залоз. Активує утворення харкотиння, нормалізуючи його реологічні властивості (в'язкість, еластичність, адгезивність), підсилює перистальтичні рухи бронхіолі моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню харкотиння. Натрію гідро карбонат при пероральному застосуванні частково ре-зорбується та виділяється бронхіальним залозами, додатково стимулюючи утворення рідкого компонента бронхіального слизу, полегшуючи його відходження.

Фармакокінетика. Не досліджена.

Показання для застосування. Гострі і хронічні запальні захворювання органів дихання: трахеїти, бронхіти, пневмонія.

Спосіб застосування та дози. Препарат призначають дорослим та дітям старше 14 років по 1-2 таблетки 3 рази на добу, дітям до 14 років дозу і курс лікування призначає лікар. Препарат приймають перед їжею. Для застосування удітей таблетку можна розчинити у 1/3 стакана теплої води і додати цукровий або фруктовий сироп.

Тривалість курсу терапії визначається індивідуально в залежності від ефективності терапії і, як правило, складає 7-14 днів.

Побічна дія. Інколи можливий розвиток алергічних реакцій у вигляді шкірного свербіжу, кропивниці. При виникненні побічних ефектів разову дозу препарату необхідно зменшити в 2 рази і відповідно збільшити частоту прийому. Якщо побічні явища не зникнуть, препарат відмінюють.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Не виявлено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не виявлена.

Умови та термін зберігання. В сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці. Термін придатності препарату 3 роки.