

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

АДЖИСЕПТ

(AGISEPT)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості:

«АДЖИСЕПТ®» класичні: червоного кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом анісу і м'яти, кислі на смак; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» з ментолом та евкаліптом: від блакитного до зеленувато-блакитного кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом ментолу та евкаліпта, кислі на смак; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» з медом та лимоном: жовтого кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом лимона, кислі на смак; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» зі смаком апельсина: оранжевого кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом апельсина, кислі на смак; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» зі смаком лимона: жовтого кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом лимона, кислі на смак; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» зі смаком полуниці: червоного кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом полуниці, кислі на смак; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» зі смаком ананаса: жовтого кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом ананаса; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» зі смаком банана: жовтого кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом банана; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» зі смаком вишні: червоного кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом вишні; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» зі смаком малини: червоного кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом малини; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

«АДЖИСЕПТ®» зі смаком меду: темно-жовтого кольору, круглі, двоопуклі пастилки для смоктання з ароматом меду; допускається наявність незначних пухирців повітря всередині карамельної маси, нерівномірність інтенсивності забарвлення пастилок і нерівність країв;

склад:

1 пастилка для смоктання містить:

2,4-дихлорбензиловий спирт.....1,2 мг, амільмет крезол.....0,6 мг,

допоміжні речовини: кислота лимонна безводна, олія анісова, олія евкаліптова, олія лимонна, медова віддушка, олія м'яти перцевої, ментол, лаурилсульфат натрію, глюкоза рідка, цукор, барвники: Carmoisine, Понсо 4R, індігокармін, карамельний, хіноліновий жовтий, "сонячний захід", ароматизатори: апельсиновий, лимонний, полуничний.

Форма випуску.Пастилки для смоктання: класичний, з ментолом та евкаліптом,

з медом та лимоном, зі смаком апельсина, зі смаком лимона, зі смаком полуниці.

Фармакотерапевтична група. Антисептичний препарат.

Код АТС R02A A20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Комбінований антисептичний препарат для місцевого застосування у порожнині рота і глотки. Має протимікробну дію. Активний щодограм позитивних і грам негативних мікро організмів.

Натуральні лікувальні добавки здійснюють протизапальну дію через слизову оболонку порожнини рота і глотки.

У зв'язку з низькою системною абсорбцією дані про фармакокінетику препарату Аджисепт відсутні.

Показання для застосування. Інфекційно-запальні захворювання порожнини рота і глотки.

Спосіб застосування та дози. Дорослим призначають по 1 пастильці кожні 2 год. Максимальна добова доза — 8 пастилок. Дітям старше 12 років призначають по 1 пастильці кожні 4 години. Пастилки розсмоктують до повного розчинення. Тривалість лікування — 3 – 4 дні.

Побічна дія. При застосуванні за показаннями у рекомендованих дозах побічної дії препарату не відзначено.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Діти до 12 років.

Передозування. Випадкове або навмисне передозування препарату мало ймовірне. Передозування може проявлятися у вигляді дискомфорту з боку шлунково-кишкового тракту. У такому разі проводять симптоматичне лікування.

Особливі вказівки. При призначенні препарату пацієнтам, хворим на цукровий діабет, необхідно враховувати, що в кожній пастильці міститься цукор.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 30° С в темному місці, захищеному від впливу вологи, пилу та сонячних променів.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

При дотриманні вищевказаних умов зберігання термін придатності препарату становить 3 (три) роки.

Не рекомендується використовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!