

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

МУКАЛТИН®

(MUCALTIN)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: таблетки сірувато-буруватого кольору з вкрапленнями, плоско циліндричні з рискою і фаскою. Швидко реагують у присутності води з виділенням вуглекислого газу;

склад: 1 таблетка містить мукалтину 0,05 г;

допоміжні речовини: натрій двовуглекислий, кислота винна, кальцію стеарат.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05CA 05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Мукалтин— відхаркувальний засіб, дія якого забезпечується секретолітичними і бронхолітичними властивостями. Препарат виявляє помірну протикашльову дію, зменшуючи кількість нападів кашлю та їх інтенсивність. Мукалтин нетоксичний і не має місцевого подразнювального впливу.

Фармакокінетика. Неописана.

Показання для застосування. Гострі і хронічні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, пневмонії, бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма, туберкульоз легенів з явищами неспецифічного бронхіту).

Спосіб застосування і дози. Препарат призначають 3 - 4 рази на день до їди. Дорослим призначають по 1 - 2 таблетки на прийом. Разові дози для дітей, залежно від віку, становлять: до 1 року – 0,5 таблетки, 1 - 3 роки – 1 таблетка, з 3 років – 1 - 2 таблетки.

При застосуванні у дітей препарат можна розчинити в 1/3 склянки теплої води, додавши цукровий або фруктовий сироп.

Курс лікування – до 15 днів. Тривалість курсу лікування встановлюється залежно від тяжкості та перебігу захворювання.

Побочна дія. Можливі алергічні реакції (кропив'янка, свербіж).

Протипоказання. Гіпер чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Про випадки передозування препаратом немає інформації.

Особливості застосування. Досвід застосування у вагітних і в період лактації відсутній.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Мукалтин можна застосовувати одночасно з іншими протикашльовими і відхаркувальними засобами.

Умови і термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі від +8°C до +15°C. Термін придатності – 4 роки.